

●悪性リンパ腫

症例 23 : 30 代 女性

病状 : ステージ III の悪性リンパ腫であり、右頸部に直径 2cm 程度のリンパ節腫脹が認められた
 治療 : 化学療法を先延ばしとし、コロイドヨード療法を実施した。週 6 回の注射 (1 回 30ml) を 2 週間連続で行い、この時点での頸部のリンパ節腫脹は認められなくなった。その後は、週 3 回の注射とし、1 回 30ml、2 時間ごとに 1 日 8 回の C.I.M.N の内服を併用した
 結果 : 約 2 ヶ月で完全寛解と診断され、化学療法は中止となり経過観察となったが、3 年経過した現在でも再発は認められない

●てんかん

症例 24 : 20 代 女性

病状 : てんかん発作に悩まされていた
 治療 : C.I.M.N 注射を週 2 回続けた
 結果 : 1 ヶ月後には、まったく発作が起こらなくなった

●認知症

症例 25 : 70 代 女性

病状 : 認知症と診断された。1 ヶ月前から、つじつまのあわない発言をするようになった
 治療 : 家族の希望で、C.I.M.N の内服を開始
 結果 : 3 ヶ月後には、家族との会話も問題なく、元気に生活できるようになった

●白血病

症例 26 : 60 代 女性

病状 : 白血病で余命 3 週間と宣告された
 治療 : 30ml の C.I.M.N の注射を 1 日 1 回行ったところ、1 ヶ月で末梢血の腫瘍細胞が消滅した。その後 1 ヶ月同注射を継続して行った
 結果 : 現在は元気に通常の生活をしている

【脳血管障害】

●脳血栓

症例 27 : 60 代 男性

病状 : 左腕がマヒし、夜就寝時の痛みで悩まされる
 治療 : 50ml の C.I.M.N を 1 日 3 回内服した
 結果 : 約 1 ヶ月後には痛みが緩和され、マヒした左腕は 1 ヶ月後には動くようになった。その後、継続して内服し、言語障害もあったが、4 ヶ月後には改善した